

د گل لرونکو نباتاتو جوړښت

رېښه

رېښه دوه عمده او اساسي دندې سرته رسوي: رېښه په ځمکه کې نبات ټینګ ساتي. رېښه د نبات لپاره اوبه او په اوبو کې منحل منرالونه برابروي. سره له دې رېښه جذبې غړی دی. اکثراً نباتات نېغې رېښې او لږې فرعي رېښې لري. د گازرې رېښې یو ښه مثال دی. په نورو د وښو ډولونو په شمول نباتاتو کې، خپرې رېښې د لنډ مودې وروسته مړه کېږي او بیا د نبات له بېخ څخه وده کوي، زیاتې خپرې او په عین جسامت رېښې لري چې مونږ ورته خپرې رېښې وایو.

تنه یا ساقه


یو دساقې وظیفه دا ده چې زایلیم اوبه او په اوبو کې منحل مواد له رېښو څخه پاتو ته لېږدوي. دا انتقال د مړه شوې حجراتو لخوا سرته رسېږي. ساقه هم د رېښې حجراتو ته عضوی مواد لېږدوي. دا انتقال د زونډیو حجراتو لخوا سرته رسېږي. ساقه نبات نېغ او ټینګ ساتي. پاتو د ساقو په اوږدو کې یا د ساقو د ورستیو برخو له پاسه ترتیب موندلی وي. د ساقې له پاسه د پاتو ګلونو ترتیب او تنظیم له پاتو او ګلونو سره مرسته کوي او وروسته ګلان چې د ساقې له پاسه دي، په ګردې خپرونه کې مرسته کوي. دا مهم دي ځکه چې پاتې رڼا ته اړتیا لري، ګلونه حشرې یا باد ته اړتیا لري میوې ممکن د خپریدو لپاره مرغانو یا باد ته اړتیا ولري. ساقې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته وده کوي، چې پدې توګه دوه دندې لري: نیغ ساتل او انتقال.

پاڼه

پاڼه د ضیایي ترکیب وظیفه په غاړه لري. دا په دې معنی ده چې د ډیر رڼا اخیستلو لپاره پاتې باید ډېرې غټې او هوږې وي. مګر غټې پاتې هم یو زیان لري ځکه چې دا ډول پاتې د بخار له لارې ډیری اوبه له لاسه ورکوي. هغه نباتات چې وچکالۍ سره سازګاری نه لري: دوی نشي کولی غټې او هوږې پاتې ولري، مګر دوی باید د ساسج په توګه لوله شي ترڅو چې د تبخیر سطحه د اوبو ضایعات راټیټ شي.

ګل

ګل یو له ګل لرونکو نباتاتو جنسی غړو څخه شمیرل کیږي. او له دې کبله ګل جنسي حجرې تولیدوي، چې د تکثر لپاره یې اختصاص موندلی دی. یو بشپړ ګل په لاندې برخو مشتمل دی:



1د گل اناتومی. Foto:Lumbrikus.no

په لاندې برخه د گل بنسټ لیدل کېږي. د گل بنسټ د گل نورو برخوچې پاني لري د نیغ سالتو لپاره دنده لري. او بله یې پرسېدلې جوړښت دی چې د گل پاني، د تذکیر او تانیث آلي پرې واقع دي. بیا لاندې یا په منځني برخه کاسبرگ او گل پاني د گل جسمي یا مرستندویه پاني دي. کاسه پاني یا کاسبرگ معمول شین رنګ لري، د گل د غونچې یا د گل د پاسنۍ برخې ساتنه کوي. بیا 1-2 دانې د گل باک ګرده شیندنې سره او په پای کې تخمدان / تخمدانونه شتون لري. کاسه پاني یا کاسبرگ معمولاً شین یا نصواري رنګ لري. د دوی دنده دنسل تولید ارګانونو ساتنه ده، په ځانګړي توګه د جوانې مرحله کې. گلپاني د گل د کاسې له پاسه ځای لري زیاتره گل پاني زړه راکښونکي رنګ لري. حشرات ځانته جلبوي چې په دې ترتیب د ګردې خپرونې لامل کېږي. زیاتره نباتات د نکتار غدې لري چې د گل پانو په قاعده کې واقع وي. غدې خوږه مایع چې خوږ بوی لري، ترشح کوي او د حشراتو په جلبولو کې مرسته کوي، ترڅو ګردې خپرونې ته چټکتیا ورکړي. د گل پانو مجموعه د گل د جام په نامه یادېږي. میله څو باک لرونکي وي. باک د ګردې دانې مکروسپورتولیدوي. هر باک د یوې میلې او د سپورونو له کڅوړې څخه جوړ شوی وي. په انتر کې د پولین ګرین په نامه د ګردې دانې جوړېږي. د تانیث آله دننۍ حلقه ده چې پرسېدلې برخه یا تخمدان ګردنه چې د پايي یا میلې په بڼه وي او بله برخه یې سټګما ده چې د ګردنې په سر کې واقع ده او سربېرناکه ماده لري. تخمدان د تخمو ساتونکې کوټه ده، ښځینه جنسي حجره (ښځینه ګامیت) یې په دننه کې وده کوي چې له هرې تخمې څخه یوه دانه تشکیلېږي، د تخمدان د بڼې د تغیر، پخېدلو او رسېدلو څخه مېوه وده کوي یعنې پوښ شوي تخمدان ته مېوه وايي.

په گل کې د تخمدانونو شمیر توپیر لري. په پورتنۍ برخه کې مور کلاله موندلای شو، ورپسې یو نری برخه ستایل موقعیت لري. مور لاندې برخې ته د میوې غوټې یا تخمدان وايو. تخمدان د تخمو ساتونکې کوټه ده، ښځینه جنسي حجره ښځینه ګامیت یې په دننه کې وده کوي. کله چې تخمه په تخم یا دانې بدلېږي، تخمدان کیدای شي بو یا څو دانې مختلف ښځینه جنسي حجره جوړ کړي.

Kilder:

Blomsterplanenes bygning. Hentet fra:

Oppdag naturen, biologi for lærere, grunnskolelærerutdanning. Per Ivar Kvammen, Sigmund Lie, Gunnar Christian Nyhus, Trond Vidar Vedum, Torbjørn Ødegaard.

Foto:Lumbrikus.no